

PHARMACIE AGRÉÉE HAS

2 – SAISIE DES POSOLOGIES


Les posologies de la pharmacie HelloDoc peuvent être saisies en texte libre auquel cas elles ne feront pas jouer la notion de durée utile pour les interactions médicamenteuses.

C'est pourquoi nous détaillerons ici la saisie des posologies à l'aide des pavés numériques qui donneront à HelloDoc tous les paramètres nécessaires à l'analyse des ordonnances.


Les onglets de saisie

Lorsqu'on ouvre le module « Edition d'une posologie », on se trouve face à 2 onglets.

L'onglet « Nyctémère » :



L'onglet « Paramètres » :



Chacun de ces onglets comporte 4 fenêtres miroirs, celles de l'onglet « Paramètres » permettant d'apporter des compléments ou des corrections aux saisies faites depuis « Nycthémère ».

La fenêtre d'édition

La zone d'édition proprement dite, telle qu'elle apparaîtra sur l'ordonnance, se trouve au-dessus et permet de contrôler l'exactitude de la saisie depuis les onglets. Il est possible d'y rajouter du texte saisi manuellement, ou d'y apporter des corrections.

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
HELICIDINE 10 % sirop : Fl/250ml

1 cuillerée à soupe (voie orale) le matin, le midi et le soir

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nycthémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
1	Matin 10 h	Avant	3	0	Et
7 8 9	Midi 16 h	Pendant	7 8 9	7 8 9	Puis
4 5 6	Soir	Après	4 5 6	4 5 6	Libre
1 2 3	Coucher		1 2 3	1 2 3	
0 . <	Nuit		0 <	0 <	Supprimer
1/4 1/2 3/4	Journée		Pair Imp.	an	

Nycthémère Paramètres

Enregistrer dans la liste des posologies Prescrire immédiatement le produit avec cette posologie

Nous allons maintenant envisager plusieurs exemples de posologies, des plus simples aux plus complexes.

SPASFON cp enr : B/30

2 comprimés (voie orale) le matin, le midi et le soir, pendant 5 jours

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
2	Matin 10 h		3	5	Et
	Midi 16 h				Puis
	Soir				Libre
	Coucher				
	Nuit				
	Journée				Supprimer

Paramètres Nyctémère

Paramètres

Prise	Moment des prises	Fréquence	Durée	Ligne
2 à 0	le matin, le midi et le soir	3 à fois par	5 à jours	Et
comprimé		jour		Puis
par :				Libre
				Supprimer

Paramètres Nyctémère

Aucune difficulté, on saisit la quantité, l'heure et la durée.

<2>, <Matin>, <Midi>, <Soir>, <5>, <1>.

« comprimé » et « voie orale », sont automatiquement choisis par Vidal.

Les paramètres reprennent ce qui a été saisi dans « Nyctémère » et n'ont pas à être modifiés.

HELICIDINE 10% sirop : FI/125ml

2 cuillerées à café (voie orale) le matin, le midi et le soir, pendant 1 semaine

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
HELICIDINE 10 % sirop : FI/125ml

2 cuillerée à café (voie orale) le matin, le midi et le soir, pendant 1 semaine

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
2 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	3 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ↻ < Pair Imp. 1 7 31	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
HELICIDINE 10 % sirop : FI/125ml

2 cuillerées à café (voie orale) le matin, le midi et le soir, pendant 1 semaine

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Paramètres

Prise	Moment des prises	Fréquence	Durée	Ligne
2 à 0 cuillerées à café par :	le matin, le midi et le soir,	3 à fois par jour	1 à semaine	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

- On choisit « cuillerée à café » dans la liste déroulante « Unité ».
- Vidal ne met pas au pluriel les unités de prise composées de plusieurs mots.
- On corrige le pluriel depuis « Paramètres »

XANAX 0,25 mg cp séc : B/30

1/2 comprimé (voie orale) le matin et le midi, et 1 comprimé (voie orale) le soir, le tout pendant 2 semaines

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
XANAX 0,25 mg cp séc : B/30

1/2 comprimé (voie orale) le matin et le midi

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
0,5 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	2 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ↻ < Pair Imp. 1 7 31	0 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

On saisit d'abord la poso par 1/2 comprimé, puis on introduit la dose du soir par « Et » :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
XANAX 0,25 mg cp séc : B/30

1/2 comprimé (voie orale) le matin et le midi, et 1 comprimé (voie orale) le soir, le tout pendant 2 semaines

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ↻ < Pair Imp. 1 7 31	2 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

LEVOTHYROX 75µg cp séc : B/30

1 comprimé 1/2 (voie orale) le matin, pendant 3 mois

Pour saisir 1 comprimé 1/2, il faut taper 1.5

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
LEVOTHYROX 75µg cp séc : B/30

1 comprimés 1/2 (voie orale) le matin, pendant 3 mois

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
1,5 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < . 1/4 1/2 3/4 Unité : comprimé Voie : orale	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < . Pair Imp. 31	3 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < . 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

Vidal considère que 1,5 est au pluriel, donc on va dans nyctémère et on sélectionne « comprimé » dans la liste déroulante afin de rétablir la bonne orthographe :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
LEVOTHYROX 75µg cp séc : B/30

1 comprimé 1/2 (voie orale) le matin, pendant 3 mois

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Paramètres

Prise	Moment des prises	Fréquence	Durée	Ligne
1,5 à 0 comprimé par :	le matin,	1 à fois par jour	3 à mois	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

DAFALGAN 500 mg gél : B/8

De 1 gélule à 2 gélules (voie orale) 2 à 3 fois par jour, selon les douleurs 4 boîtes

La lettre « à » sera obtenue avec le signe « > » ou « < » (selon le sens il indique une valeur ascendante ou descendante).

On va donc taper « 1 », « > », « 2 » pour la quantité, puis « 2 », « > », « 3 » pour la durée

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
DAFALGAN 500 mg gél : B/16

De 1 gélules à 2 gélules (voie orale) 2 à 3 fois par jour

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nythémère

Quantité (max)	Heure	Repas	Fréquence (max)	Durée	Ligne
2 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . > 1/4 1/2 3/4	Matin 10h Midi 16h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	3 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 > Pair Imp. 31	0 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nythémère Paramètres

Là encore on voit des problèmes de pluriel. On peut passer par Paramètres :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
DAFALGAN 500 mg gél : B/16

De 1 gélule à 2 gélule (voie orale) 2 à 3 fois par jour

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Paramètres

Prise	Moment des prises	Fréquence	Durée	Ligne
1 à 2 gélule par :		2 à 3 fois par jour	jour à jour	Et Puis Libre Supprimer

Nythémère Paramètres

mais ça ne résoud pas le problème puisque tout se met alors au singulier. On corrigera donc manuellement à la fin.

La mention « selon les douleurs 4 boites » sera ajoutée depuis « Libre »

The screenshot shows a software window titled "Édition d'une posologie". At the top, it displays "Libellé de la posologie" and "DAFALGAN 500 mg gél : B/16". Below this is a text field containing "De 1 gélule à 2 gélule (voie orale) 2 à 3 fois par jour". There are two checkboxes: "Saisir la durée lors de la prescription du produit" and "Saisir un descriptif". A yellow bar labeled "Nyctémère" is visible. Below it is a table with two columns: "Libellé libre" and "Ligne". The "Libellé libre" cell contains "selon les douleurs 4 boites", which is circled in red. The "Ligne" column contains buttons: "Et", "Puis", "Libre" (circled in red), and "Supprimer". At the bottom right of the table area is a green "Valider" button (circled in red) and a red "Supprimer" button. At the very bottom, there are icons for "Nyctémère" and "Paramètres".

puis <Valider>.

La correction manuelle de l'orthographe et de la ponctuation se fera directement dans la fenêtre d'édition :

This screenshot shows the same "Édition d'une posologie" window. The main text field now contains "De 1 gélule à 2 gélules (voie orale) 2 à 3 fois par jour, selon les douleurs 4 boites". There are red underlines under "gélules" and "selon les douleurs". The checkboxes at the bottom are "Saisir la durée lors de la prescription du produit", "Saisir un descriptif", and "Afficher les lignes de la p".

PREVISCAN 20 mg cp quadriséc : B/30

*1/2 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour pair et
3/4 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour impair*

Pas de difficultés particulières, on tape dans l'ordre <1/2>, <Journée>, <Pair> :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PREVISCAN 20 mg cp quadriséc : B/30

1/2 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour pair

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nychtémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
0,5 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	1 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < Pair Imp. 31	0 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nychtémère Paramètres

et ensuite <Et>, <3/4>, <Journée>, <Imp.>

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PREVISCAN 20 mg cp quadriséc : B/30

1/2 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour pair et 3/4 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour impair

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nychtémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
0,7 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	1 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < Pair Imp. 31	0 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nychtémère Paramètres

Pour une meilleure présentation dans l'ordonnance, on peut introduire un saut de ligne dans la zone d'édition, pour cela on utilise Ctrl-Entrée :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PREVISCAN 20 mg cp quadriséc : B/30

1/2 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour pair
et 3/4 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour impair

PARLODEL INHIBITION DE LA LACTATION 2,5 mg cp séc : B/20

1/2 comprimé (voie orale) le premier jour

puis 1 comprimé (voie orale) le matin, le 2ème jour

puis 1 comprimé (voie orale) le matin et le soir pendant 14 jours

On procède par étapes :

<1/2>, <Matin>, <1>, <1> :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PARLODEL INHIBITION DE LA LACTATION 2,5 mg cp séc : B/20

1/2 comprimé (voie orale) le matin, pendant 1 jour

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
0,5 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ↻ < Pair Imp. 1 7 31	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

Ensuite : <Puis>, <1>, <Matin>, <1>, <1> :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PARLODEL INHIBITION DE LA LACTATION 2,5 mg cp séc : B/20

1/2 comprimé (voie orale) le matin, pendant 1 jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin, pendant 1 jour

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ↻ < Pair Imp. 1 7 31	1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

Enfin <Puis>, <1>, <Matin>, <Soir>, <1>, <4>, <1>

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PARLODEL INHIBITION DE LA LACTATION 2,5 mg cp séc : B/20

1/2 comprimé (voie orale) le matin, pendant 1 jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin, pendant 1 jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin et le soir, pendant 14 jours

Saisir la durée lors de la prescription du produit Saisir un descriptif Afficher les lignes de la posologie

Nyctémère

Quantité	Heure	Repas	Fréquence	Durée	Ligne
1 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 . < 1/4 1/2 3/4 Unité : comprimé Voie : orale	Matin 10 h Midi 16 h Soir Coucher Nuit Journée	Avant Pendant Après	2 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ↻ < Pair Imp. 1 7 31	14 ← × 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < 1 7 31 an	Et Puis Libre Supprimer

Nyctémère Paramètres

On peut figoler ensuite dans la zone d'édition en corrigeant de façon à obtenir :

Édition d'une posologie

Libellé de la posologie
PARLODEL INHIBITION DE LA LACTATION 2,5 mg cp séc : B/20

1/2 comprimé (voie orale) le matin, le premier jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin, le 2ème jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin et le soir, pendant 14 jours

Christian HUMBERT